



ٺيڪ ٽيهه سال اڳ، 1994 جي بهار ۾، اسلامڪ رليف پاڪستان پنهنجي سفر جي شروعات ملڪ جي لکين ماڻهن لاءِ سون، اميد ۽ موقعا آڻڻ کان علاوه زندگين کي تبديل ڪرڻ جي واحد مشن سان ڪئي. رحم، نگهباني، خلوص، سماجي انصاف ۽ فضيلت جون اسان جون قائم ڪيل قدرون اسان کي بهترين ممڪن طريقي سان انسانيت جي خدمت ڪرڻ جي هدايت ڪن ٿيون.

گذريل ٽن ڏهاڪن دوران، اسان پاڪستان ۾ هڪ مستقل تبديلي آڻڻ لاءِ پنهنجن واعدن تي عمل ڪري رهيا آهيون. 'ضرورت مندن تائين پهچڻ' ۽ 'زمين تي پهرين' کي اسان جي نشانين جي طور تي، اسلامڪ رليف پاڪستان ملڪ کي درپيش گهري مسئلن جهڙوڪ غربت، پاڻي، صفائي ۽ صفائي، کاڌي جي حفاظت ۽ گذر سفر، موسمياتي تبديلي، صحت، يتيم ۽ عورتن کي باختيار بڻائڻ سميت هنگامي جواب ۽ آفت جي خطري ۾ گهٽتائي کي حل ڪري رهيو آهي.

جيئن ته اسان پنهنجي وقت جي سڀ کان اهم مسئلن لاءِ حل ڳولڻ لاءِ ڪم ڪريون ٿا، اسلامڪ رليف پاڪستان هميشه پاڪستان جي لڳلدار ماڻهن جو قرضدار رهندو جن اسان کي وڌڻ ۽ خدمت ڪرڻ ۾ مدد ڪئي.



# نقصانڪار جينن کي طايطي ۽ آڻڻ

## جا ماحول دوست طريقا

## Integrated Pest Management (IPM)



رياض علي سيال  
عرفان احمد وسٽرو  
ايڊريڪلر آفيسر  
ايڊريڪلر آفيسر

پاران اسلامڪ رليف پاڪستان

سهڪار: ناروي جيئن ايمبيسي

## فهرست

| # | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❖ | تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ❖ | فائد یمند ۽ نقصانڪار جيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ❖ | نقصانڪار جيتن جي سڃاڻپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ساڻو مھلو (Jassid)</li> <li>اڇي مک (White Fly)</li> <li>جونء (Spider Mite)</li> <li>ميلي پگ (Pseudococcus obscurus)</li> <li>چٽڪرو ڪينٽون (Spotted Bollworm)</li> <li>آمريڪن ڪينٽون (American Bollworm)</li> <li>گلابي ڪينٽون (Pink Bollworm)</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| ❖ | فائد یمند جيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ساڻي رنگ وارو پوپٽ (Chrysoperia Comea)</li> <li>چٽڪري ٽنڊڻي (Ladybird Beetle)</li> <li>پٽي واري ٽنڊڻي (Rove Beetle)</li> <li>پائريٽ اوريس هٽگھڻ پڇو (Pirate Bug)</li> <li>ساڻي رنگ وارو هٽگھڻ (Campylomma)</li> <li>سرفه فلاء (Syrphid Fly)</li> <li>ڏينپو (Wasp)</li> <li>وڏين اکين وارو هٽگھڻ (Geocoris)</li> <li>ڪوريٽزو (Spider)</li> <li>طفيلي ڪيڙا (Parasitic wasp)</li> <li>ٽرائيڪوگراما (Trichogramma)</li> </ul> |
| ❖ | حياتياتي طريقن مان فائدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ❖ | مختلف قسمن جي جيتن جي نقصان جي اقتصادي حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ❖ | جيتن کي ڪنٽرول ڪرڻ جا مختلف طريقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>هٿرادو طريقو (Cultural Control)</li> <li>حياتياتي ڪنٽرول جو طريقو (Biological Control)</li> <li>دوائن وسيلي ڪنٽرول ڪرڻ جو طريقو (Chemical Control)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## پيش لفظ

ڪجهه وقت اڳي جڏهن انسان پنهنجي آس پاس جي ماحول کي پنهنجو سمجهندو هو، ضرورت آهر زمين مان پيداوار حاصل ڪندو هو تڏهن فصلن تي جيتن جو حملو به ڪنهن قدر گهٽ ٿيندو هو ۽ وڇرندڙ بيماريون به نه هجن جي برابر هونديون هيون.

ٿوري ۽ پائيدار پوکي مان ماڻهن جون هڙتي ضرورتون پيون پوريون ٿينديون هيون. پر جڏهن کان آدم جي اولاد ۾ حرص وڌيو آهي ۽ ضرورت کان زياده آمدني جي ڍڙ ۾ وسيلن جو بيجا استعمال ڪري وڌيڪ آيت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ ۾ مصروف ٿيو آهي تڏهن کان ماحول ۾ بگاڙ پيدا ٿي پيو آهي، نتيجي ۾ هن وقت موجود مڙي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي. ان عمل انسان جو جيئن جنجال ڪري ڇڏيو آهي، انهيءَ ۾ سندس اباڻي پيشو زراعت گهڻو متاثر ٿيو آهي. ان جو جيڪڏهن ڪاٿو ڪجي ته انساني دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ نقصان ان انسان جو ٿيو آهي جنهن ماحول کي بگاڙڻ يا خراب ڪرڻ ۾ گهٽ ڪردار ادا ڪيو آهي. ڇو ته وسيلن جو وڏو حصو سرندي وارن جي حوالي آهي.

ان ڪري ننڍا آبادگار بي يارو مددگار بڻيل آهن. سندن وس ۾ نه ته ڪيميائي پاڻ جون گريون قيمتون ادا ڪرڻ آهي ۽ نه وري بيمارين کان بچاءَ لاءِ دوائون سندن هٿ ۽ وس ۾ آهن. انهي ڪري اٽل ۽ بي چاڻ جي سفر جو هي سلسلو انهن تمام آبادگارن لاءِ نه صرف معلومات جو ذريعو آهي پر سندس سڄي سال جي محنت ۽ مزدوري کي بچائڻ ۽ خوراڪ تي آسان رسائي لاءِ پڻ جوڳو ذريعو ثابت ٿيندي، جنهن سان ننڍا آبادگار پنهنجي فصلن جي پهرين کان بهتر سارنڀال ڪري سگهندا ۽ هن ڪتابچي مان ڪين فصل تي لڳندڙ مختلف نقصانڪار جيتن ۽ فائيديمند يا دوست جيتن جي سڃاڻپ سان گڏوگڏ دوست جيتن کي بچائيندي ۽ نقصانڪار جيتن کي ماحول دوست طريقن سان ضابطي ۾ آڻڻ ۾ مدد ملندي.

نھش ڪھار پروجڪٽ  
ڪارڊيٽر IRP

| فائديمند جيت                                                                                                                                                                                          | نقصانڪار جيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>لئس ٽنڊڻي (ليس)</li> <li>پتي واري ٽنڊڻي (پيڊرس)</li> <li>وڏين اڪين وارو مُنگهڻ (جيئوڪورس)</li> <li>هاور مک (هاور فلائي)</li> <li>نيبس مُنگهڻ (نيبس)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>پن ويڙهو پوپٽ (ڪاٽن ليف وارو)</li> <li>سونهرو ٿڙڙو (ٿڙپ)</li> <li>سائو محلو جوان، ٻچا (جيسڊ)</li> <li>ايڊلٽ، نمف</li> <li>اڇي مک ٻچا (وائٽ فلائي نمف)</li> <li>جونءَ (اسپائيڊر مائٽ)</li> <li>چٽڪرو، آمريڪن، گلابي، پن ويڙهو ۽ انهن جا ڪيڻاڻ (لاروا)</li> <li>جيڪي فصلن لاءِ تمام نقصانڪار آهن</li> </ul> |

هي هئا مختلف نالا فائديمند ۽ نقصانڪار جيتن جا جن جي نقصان ڪرڻ جا مختلف انداز ۽ مرحلا آهن. جيڪي جيتن جي قدرتي نظام تحت مختلف نمونن ۾ سامهون ايندا آهن جن ۾ ڪافي رس چوسيندڙ جيت آهن جيڪي فصل کي شروعات کان آخر تائين رس چوسي ڪوڪلو ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ٻيا ڪافي پن ڇڏيندڙ جيت آهن جيڪي پنن کي نقصان پهچائيندا رهندا آهن جنهن سان فصل جي اڳتي وڌڻ واري صلاحيت مڪمل طور متاثر ٿيڻي ٿي ۽ ٻيا ڪافي جيت اهڙا به آهن جيڪي بيمارين کي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ فصل ۾ پکيڙيندا رهندا آهن.

ان عمل سان ڪافي نقصان جا انديشا جنم وٺندا آهن ۽ هاڻي فائديمند جيتن تي نظر وجهون. قدرت جي قانون تحت دنيا ۾ ڪافي فائديمند جيت موجود آهن جن تي مختلف تجربا ۽ تحقيقون جاري آهن جن ۾ پريڊيٽر (Predator)، يعني نقصانڪار جيتن کي ۽ ان جي ٻچن کي سئون سڌو کائيندڙ جيت جنهن جي کائڻ جا مختلف انداز آهن ڪجهه ڪيڻن واري شڪل ۾ ته ڪجهه پوپٽ واري شڪل ۾ جيڪي نقصانڪار جيتن جي ٻچن، ڪيڻن کي کائي شروعاتي مرحلي ۾ ئي فصلن کي بچائڻ شروع ڪندا آهن ۽ پنهنجي تعداد کي وڌائيندي نقصانڪار جيتن جو خاتمو ڪندي پنهنجو قدرتي ڪردار ادا ڪندا رهندا آهن ۽ ٻيا پيراسيٽوائڊ (Parasitoid) جيت جيڪي نقصانڪار جيتن جي بيهڻ،

## تعارف

دنيا جي پيٽ ۾ پاڪستان ۾ زهر جو غير ضروري استعمال انسانن، حيوانن، زمين ۽ پاڻي سان گڏ ماحولياتي زندگي لاءِ به زهريليون ۽ تباه ڪن ثابت ٿي رهيون آهن ۽ انهن جا اثر جاندارن کي متاثر ڪري رهيا آهن. اها ڳالهه به ذهن ۾ هجي ته جيڪو ميوو، سبزي، اناج زهر واري عمل مان گذري ٿو ته اهو ٻين جيوتن سان گڏ انسان لاءِ به روزمره جي زندگي ۾ استعمال ٿيندو آهي.

حياتياتي نظام تحت ماهرن مختلف تحقيقن کان پوءِ تمام سولا آسان طريقا سامهون آندا آهن هر عمل جو پنهنجو ڪردار آهي. اهڙي ريت فصل جي پوکي کان وٺي لڀاري جي سفر تائين جيڪڏهن حياتياتي نظام کي عمل ۾ آڻبو ته زهر جي ضرورت نه پوندي. ائون چاهيان ٿو ڪجهه فائديمند ۽ نقصانڪار جيتن جا نالا شامل ڪريان.

## فائديمند ۽ نقصانڪار جيت

| فائديمند جيت                                                                                                                                                                                                                                               | نقصانڪار جيت                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>سائي رنگ وارو پوپٽ (ڪرائسوپرلا)</li> <li>سائي رنگ وارو پرمار ڪيڻئون (ڪراسوپرلا لاروي)</li> <li>ڪورينٽو (اسپائيڊر)</li> <li>سائي رنگ واري مک (ڪمپلوي)</li> <li>اوريس مُنگهڻ ٻچو (پاٿوٽ بگ)</li> <li>اوريس</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ڪارو ٿڙڙو (ٿڙپ)</li> <li>سائو محلو ٻچو (جيسڊ)</li> <li>اڇي مک جوان (وائٽ فلائي)</li> <li>سست محلو (ايڊلٽ)</li> <li>چٽڪرو پوپٽ (اسپائيڊبول وارو)</li> <li>آمريڪي پوپٽ (آمريڪن بول وارو)</li> <li>گلابي پوپٽ (پنڪ بول وارو)</li> </ul> |

جيتن کي فصل کان پري رکي ٿو ۽ فائديمند جيتن کي به نقصان نٿو پهچائي. جنهن ۾ نر، سفيدو، ڌاتورو ۽ ٻيا به ڪوڙ پوٽا آهن جن تي تجربا جاري آهن. خاص ڪري نر جي نچوڙ، جي اسپري سان ڪافي رس چوسيندڙ نقصانڪار جيتن کي ضابطي يا ڪنٽرول ۾ آڻي فصلن کي بچائي سگهجي ٿو. جديد تحقيق ۾ اها ڳالهه واضح ٿي رهي آهي ته قدرتي پوٽن جي نچوڙ مان تيار ٿيندڙ دوا فصلن کي فائدو به ڏيندي ۽ حياتياتي نظام ۾ به خلل ڪانه پوندي.

هاڻي ضرورت اها آهي ته سائنسدانن ماهرن کي گهرجي ته دوست جيتن تي ريسرچ ڪري انهن جو تعداد وڌائڻ ۽ پوٽن مان تيار ٿيندڙ دوائن جا تجربا فيلڊ ۾ ڪرائي مڪمل حياتياتي نظام کي عمل ۾ آڻين ته جيئن نقصانڪار جيتن کان فصلن کي بچائي سگهجي ۽ فائديمند جيتن کي محفوظ ڪري سگهجي.

### سائو مھلو (Jassid)

هن جيت جا نوان ٻچا سائي ۽ پيلي رنگ جا ٿين ٿا جيڪي ڏيک ۾ اٽڪل اٺ ملي ميٽر ۽ شڪل ٽڪنڊي نظر ايندي آهي. مادي 25 کان 30 تائين ساواڻ تي ماعل زرد رنگ جا آنا لاهيندي آهي ٻچا 3

کان 10 ڏينهن بعد نڪرن ٿا ۽ 6 کان 21 ڏينهن ۾ بالغ ٿيو وڃن هي جيت پيندي واڱڻ ۽ ٽمائن تي پڻ حملو ڪندو آهي ٻچا توڙي وڏا پوٽي مان رس چوسين ٿا ۽ پن هيٺين پاسي مڙي ويندا آهن ۽ ڦڪاڻ مائل سائي رنگ جو ڏيک ڏيندا آهن ۽ بعد ۾ ڳاڙهاڻ تي مائل ٿي چٽيو پون. جهڙالي ۽ گهميل آبهوا ۽ فصل کي گهڻي پاڻي ڏيڻ جي صورت ۾ هن جيت جو وڌيڪ حملو ٿئي ٿو. هي جيت وونٺن تي شروعات ۾ حملو ڪندو آهي ۽ وونٺن جي فصل کي ڪافي حد تائين نقصان رسائي ٿو. فصل جڏهن 60 کان 70 ڏينهن جو ٿئي ٿو ته حملو زياده ٿئي ٿو. جولاءِ ۽ آگسٽ مهينن ۾ هن جو حملو زياده شديد ٿئي ٿو.

لارون ۾ سوراخ ڪري پنهنجا بيڊا ڏيڻ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ پيراسيٽوائڊ جا ڪيڪان يا لاروا بيهن مان نڪرندا آهن ۽ اهي لاروا نقصانڪار جيتن جي بيهن، لارون جو اندريون نظام کائي ختم ڪري ڇڏيندا آهن. اهڙي ريت نقصانڪار جيتن جا بيڊا، لاروا شروعاتي مرحلي ۾ ئي فائديمند جيتن جو ڪاڇ بڻجي وڃن. ڪيڏو نه قدرت جو ڪمال، ڪرشمو، مثال آهي انسان جي سامهون پروردگار جيتن کي ايڏي صلاحيت ۽ سوچ ڏني آهي جنهن کي انسان نظر انداز ڪري بي سبب زهر حوالي ڪري رهيو آهي ته

هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اسان انهن فائديمند جيتن کي ڪيئن بچايون ۽ نقصانڪار جيتن کي ڪيئن ختم ڪريون. ان لاءِ سڀ کان پهرين ته اسان کي زهر جي استعمال کان پاسو ڪرڻ گهرجي اهو ذڪر آئون ان لاءِ ٿو ڪريان ته اوهان پاڻ سوچو ته جيڪڏهن اسان فائديمند جيتن کي موقعو ٿي نه ڏينداسين ته ڪيئن نتيجو ملندو. ٻئي ڳالهه اها ته زرعي ادارن پاران مليل هدايتن تي مڪمل عمل ڪرڻ به فصلن لاءِ فائديمند ثابت ٿيندو آهي. هن وقت حقيقت اها آهي ته جو ڪجهه محدود فائديمند جيتن جو استعمال سالن کان پيو ٿئي جن ۾ ٽرائڪوگراما ۽ ڪرائسوپرلا سرفهرست آهن ان کان علاوه ڪوڙ سارا دوست جيت موجود آهن جن جي ڪنهن حد تائين تصديق به نه ٿي سگهي آهي جن تي تحقيق جو عمل شروع ڪرڻ گهرجي، لاپرواهي سبب ٿي زهر جو استعمال وڌندو وڃي، آبادگار پائرن کي گهرجي ته ڪجهه انتظار ڪن ۽ حياتياتي ڪنٽرول کي موقعو ڏين ته يقينن نتيجو سستو ۽ فائديمند ثابت ٿيندو ۽ سائنسي زرعي ماهرن کي به ٻين فائديمند جيتن تي تحقيق ڪرڻ گهرجي مختلف فصلن ۽ ٻين جا دورا ڪري تصديق ڪن ته ڪهڙا دوست جيت آهن ۽ انهن کي ڪيئن پالجي، انهن جو تعداد ڪيئن وڌائجي اهي سڀ تحقيقاتون ۽ تجربا وقت جي ضرورت بڻجي چڪا آهن. ان کان علاوه قدرتي پوٽن ذريعي تيار ٿيندڙ دوا به بيهڪ فائديمند آهي. اها به خدا پاڪ جي نعمتن مان هڪ قدرتي نعمت آهي. قدرتي وڻن، پوٽن جي نچوڙ جو اسپري فائديمند ثابت ٿيو آهي جيڪو نقصانڪار

## ميلبي بگ (Pseudococcus obscurus)

۽ ان کي ڪنٽرول ڪرڻ جا طريقا

هي جيت گلابي رنگ مائل اچي رنگ جو هئڻ سان گڏ جسر نرم ۽ اچي ميڻ جهڙي مادي سان ڍڪيل ٿئي ٿو. هي جيت 2 کان 5 ملي ميٽر ڊگهو ٿيندو آهي. بيضا رنگ جا نارنگي ۽ پوءِ گلابي ٿين ٿا. هن جيت جي مادي 300 کان 600 بيضا ڏيندي آهي. جيڪي بيضا زمين اندر هڪ ڪپه جهڙي ڳوٺري ۾ ڏئي ٿي، جنهن مان ڦٽندڙ ٻچا 23 کان 30 ڏينهن ۾ بالغ ٿين ٿا. انهن ڦٽندڙ ٻچن کي

ڪراٺولر (Crawler) چئبو آهي، جيڪي وڌيڪ خطرناڪ ٿين ٿا. سال ۾ هن جيت جا 15 نسل ٿين ٿا. مادي جيت کي ٻار ڪون ٿيندا آهن جڏهن ته نر جيت کي ٻار ٿين ٿا. مادي جيت جي زندگي جو ڦيرو 3 مرحلن ۾ ٿئي ٿو ۽ جڏهن ته

نر جي زندگي جو ڦيرو 4 مرحلن ۾ ٿئي ٿو. هي جيت جڏهن ٻوٽن جي حملو آور ٿيندو آهي ته ٻوٽي جي پنن، گونچن، ڏانڊين ۽ پاڙن ۾ رس چوسي ۽ هڪ منو مادو خارج ڪندو آهي، جنهن تي سينور جهڙو ته چڙهي ويندو آهي، جنهن کي سوتي مولڊ (Suti Mold) چيو ويندو آهي، جنهنڪري ٻوٽي جي واڌ ويجهه رڪجي ويندي آهي ۽ آهستي آهستي ٻوٽو سُڪي ختم ٿي ويندو آهي، يا وري ميوو گهٽ ۽ ننڍو ٿئي ٿو. هن جيت جا تمام گهڻا ميزبان ٻوٽا آهن. دنيا ۾ هن وقت 250 کان 300 ميزبان ٻوٽا ڏنا ويا آهن. هن جيت جو حملو فصل پوکڻ کان وٺي چوڏي تائين ڪنهن به وقت ٿي سگهي ٿو. ان لاءِ تمام ضروري آهي ته فصل جو معائنو ڪندو رهجي.



## اچي مک (White Fly):

هي جيت سفيد رنگ جو ٿيندو آهي. جسر تي سفيد مومي سفوف يا پاڻوڊر لڳل هوندو آهي. هن جيت کي 4 ڀر ٿين ٿا. مادي پنن جي هيٺين پاسي اٽڪل 100 کان 110 زرد مائل رنگ جا آنا لاهيندي آهي.

ٻچا توڙي وڏا ٻوٽي مان رس چوسين ٿا. هي جيت جسر مان هڪ پاڻياٺ خارج ڪندو آهي، جنهنڪري پنن تي سينور جو تهه چڙهي ويندو آهي ۽ ٻوٽي جي خوراڪ ٺاهڻ واري صلاحيت بيهڪ متاثر ٿيندي آهي. نتيجي ۾ ٻوٽي جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي. سرديءَ جي موسم ۾ هن جيت جو حملو پاجين تي پڻ ڏٺو ويو آهي. اچي مک جي حملي ڪري وونڻن تي پن مروڙ بيماري ٿئي ٿي جيڪا فصل کي تمام گهڻو نقصان پهچائي ٿي.



## جونء (Spider Mite):

هن جيت جا بالغ رنگ ۾ گاڙهاڻ يا ٿورو ساواڻ تي مائل زرد هوندا آهن. هن جيت جي پٺيءَ تي 2 ڪارا ڍڪا ۽ کيس 8 پير ٿين ٿا. مادي جونءَ پنن جي هيٺين پاسي اٽڪل 100 کن آنا لاهيندي آهي. آنا

خس خس جي دائي جيترا گول ۽ هلڪي پيلي رنگ جا ٿين ٿا. هي جيت ڪپه جو خطرناڪ دشمن آهي. سندس حملو فصل تي ڪنهن وقت ٿي سگهي ٿو. هن جو حملو جون مهيني کان شروع ٿي سيپٽمبر مهيني تائين جاري رهي ٿو. حملي واري جڳهه تي پنن جي مٿين پاسي گولائي نما گلابي نشان نظر اچن ٿا. پنن مان رس چوسجڻ ڪري پن گاڙها يا گلابي ٿي چڻيو پون ۽ ٻوٽي جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي. گرم ۽ خشڪ هوا ۾ هنن جيتن جي حملي ۾ واڌ ايندي آهي. گهڻو ڪري ڊگهي مدي وارين ۽ پاڻيٿرائيڊ گروپ واريون دوائون لڳائڻ وارين جڳهين تي سندس پکڙڻ جو امڪان وڌي ٿو.





### گوگڙي وارو چٽڪرو ڪينئون (Spotted Bollworm)

هن جيت جا 2 قسمر هوندا آهن هڪ  
ڪي فيرس انسولينا (Farias Insulana)  
جنهن جو مٿو ۽ سينو گاه جهڙو ساڻو ٿئي  
ٿو اڳيان پڙ ساوا پيلاڻ مائل هوندا آهن.

ٻي قسمر جو نالو (Vittella Erias) هوندو آهي. هن جا اڳيان پڙ هلڪا سفيد ۽  
وچ تي ساڻي پٽي سان ٿين ٿا. هنن جيتن جو ڪينئون رنگ جو هلڪو ساڻو يا  
ناسي ٿئي ٿو. وڏن ڪينئن جي جسر تي ڪارا ٽپڪا ٿين ٿا ۽ چٽڪرا ڏسڻ ۾  
ايندا آهن، البت هيٺيون پاسو هلڪو ساڻو نظر ايندو آهي. سوپٽ پيلي رنگ جي  
هڪ ريشمي خول ۾ بند هوندو آهي سوپٽ پنن، گلن ۽ زمين تي ڪريل ڪچري  
تي موجود هوندا آهن. هن جيت جا آنا هلڪي نيري رنگ جا ٿين ٿا. هن  
ڪينئين جي مادي 165 کان 240 آنا لاهيندي آهي. آنا مڪڙين، گونچن يا ننڍڙن  
گوگڙن تي لاهيندي آهي آئن مان 3 کان 9 ڏينهن اندر ڪينشان ڦٽڻ ۽ وري 7 کان  
8 ڏينهن ۾ سوپٽ جي صورت اختيار ڪندا آهن ۽ 7 کان 25 ڏينهن ۾ پوپٽ  
نڪرندا آهن، جيڪي 3 کان 4 ڏينهن زندهه رهندا آهن. هن جيت جو حملو جون  
کان سيپٽمبر تائين سخت رهي ٿو. هن جيت جو صرف ڪينئون نقصان ڪري  
ٿو. مڪڙين نڪرڻ کان اڳ هي ڪينشان اُسرنڌڙ چوٽين ۾ سوراخ ڪري ڳنڍ  
ڪايو ڇڏين، جنهن سبب چوٽيون ڪوماڻجي ڪاريون ٿي سگهيو وڃن مڪڙين کي  
اڪثر چوٽين کان سوراخ ڪري گل جا نر وارا حصا کائڻ شروع ڪن ٿا ۽ بعد ۾  
نهندڙ گوگڙي ۾ سوراخ ڪري پنهنجي ڪاروائي جاري رکن ٿا. سوراخ هميشه  
غلاظت سان ڀريل نظر ايندو آهي. حملو ٿيل گوگڙا ڪڏهن ڪونه کلن ۽ مڪڙين  
۾ وري گل ڪونه ٺهن ۽ پنهنجون پنڪڙيون ڇاڻيو ڇڏين. هن ڪينئين جي حملي  
سبب 5 کان 40 سيڪڙو مڪڙيون، گل ۽ گوگڙا برباد ٿي وڃن ٿا. اگر ڪينشان  
گوگڙي ۾ داخل ٿي ويندا آهن ته پوءِ انهن جو علاج تمام مشڪل ٿيو وڃي.

### احتياطي آپاء

پنهنجي پٺيءَ کي صاف سٿرو رکجي ۽ گند گاه ختم ڪري ڇڏجي،  
ڇاڪاڻ جو ان گندگاه ۾ هن جيت جي پرورش ٿئي ٿي ۽ گندگاه ۾ هي جيت  
وڏي ويجهي فصل کي تمام گهڻو نقصان ڏين ٿا اگر شروعاتي مرحلي ۾  
جيڪڏهن ڪجهه پوئڻ تي هي جيت نظر اچي ته اُهي پوئا پاڙئون ڪڍي ساڙي  
ڇڏجن ۽ 2، 3 جيت نظر اچن ته انهن کي هٿ سان چپي ماري ڇڏجي اگر  
وڌيڪ حملو نظر اچي ته سفارش ڪيل دوائن جو استعمال ڪجي ۽ وري 4  
ڏينهن کان پوءِ ٻيهر ڦهاريو ڪجي ته جيئن بچيل جيت به مري وڃن قدرتي  
طرح هن جيت کي ختم ڪرڻ لاءِ ٽپڪن واريون ٽنڊڻيون، ساڻي رنگ وارو  
پوپٽ (ڪرائسوپرلا) ۽ ننڍڙا ڏينيو جيڪي هن جيت کي کائي ختم ڪن ٿا  
انهن جي بچاءُ خاطر دوائن جو انڌا ڌنڌ استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ  
گهرجي هيٺ ڏنل سفارش تي عمل ڪري هن جيت مان چٽڪارو حاصل  
ڪري سگهجي ٿو. مسئلن زمين کي اونهان هر ڏيڻ، گندگاه ختم ڪرڻ،  
فصل سان گڏ ميزبان پوئڻ جو به معائنو ڪرڻ گهرجي، جيڪي اتي موجود  
هجن. متاثرن پوئڻ کي ڪڍي ساڙي ڇڏجي ۽ جيڪڏهن انهن جو تعداد وڌي  
وڃي ته ڦهاريو ڪرڻ گهرجي. هي جيت وونئشن کان علاوه تماٽي، واڱڻ،  
پينڊي، مرچن، زيتون ۽ انبن کانسواءِ ٻين ڪيترن ئي فصلن تي حملو آور  
ٿئي ٿو. انهي لاءِ سڄو سال مختلف فصلن جو معائنو ڪرڻ گهرجي ۽  
جيڪڏهن حملو نظر اچي ته زرعي ماهرن سان مشورو ڪري جيت کي  
هڪدم ضابطي ۾ آڻڻ گهرجي، جنهن لاءِ گڏيل حڪمت عمليءَ جي ضرورت  
آهي سڀني آبادگارن، زرعي ماهرن ۽ زرعي توسيع کاتي جي عملي کي  
گڏجي ڪوششون وٺڻيون پونديون وونئشن جي فصل ۾ هن جيت جي ٻر  
وقت ۽ موثر ڪنٽرول لاءِ جيت جي سڃاڻپ، نقصان جو وقت ۽ ان جي آئن ۽  
ٻچن جي باري ۾ ڄاڻ ضروري آهي، ته جيئن هن جيت کي ضابطي ۾ آڻي  
سگهجي.



### گلابي ڪينٽون (Pink Bollworm)

هي جيت شروع ۾ سفيد ٿئي ٿو. بالغ جيت (پوپٽ) پوري رنگ جو ٿئي ٿو. اڳئين ڀيري تي ڪارا ٽپڪا هوندا اٿس. ڀرن جي وچ تي هڪ ڳاڙهو ڪارو نشان پڻ

هوندو آهي. گرميءَ جي موسم ۾ گلابي ڪينٽين جي واڌ تمام گهڻي ٿئي ٿي. آگسٽ کان نومبر تائين 4 نسل پورا ڪري ٿو ۽ ڪپهه تي انهيءَ دوران سخت حملو آور ٿئي ٿو. مادي پوپٽ 100 کان 250 آنا جدا جدا مڪڙين، گلن ۽ نون ٺهندڙ گوڙن جي پاڙن ۾ لاهيندي آهي. آنا 3 کان 7 ڏينهن اندر ڦٽندا آهن. هن ڪينٽين جي هڪ خاص خاصيت هوندي آهي ته زندگيءَ جي دوران ان سوپٽ ٺهڻ بدران ننڊ ۾ هليا ويندا آهن، سياري جي ننڊ گندگاه ۽ جهنگ فيڪٽرين جي ڪچري ۾ گذاريندا آهن. پوءِ پوپٽ اپريل کان نومبر تائين نڪرندا رهندا آهن ۽ جولاءِ، آگسٽ ۾ سندس تعداد انتهائي حد تائين پهچي وڃي ٿو. هيءَ ڪينٽون مڪڙين، گلن ۽ گوڙن تي حملو آور ٿئي ٿو ۽ ٻوٽي جا نقصان ٿيل حصا ڪڍڻ شروع ٿين ٿا. جيڪڏهن درج حرارت 99 ڊگري فارن هائٽ يا ان کان زياده هوندو ته هن جيت جا آنا ۽ نئون ڦٽل ڪينٽان آڙ خود ختم ٿي ويندا آهن. ڪينٽان آگسٽ ۽ سيپٽمبر مهينن ۾ مڪڙين ۽ گلن تي حملو آور ٿي انهن جا ٿر واريءَ مادي حصو کائي پچيداني کي سوراخ ڪري اندر داخل ٿي وڃن ٿا، جنهنڪري مڪڙيون گل ٿيڻ کان اڳ ئي چڻيو پون گلن ۾ حملي بعد ڪينٽان انهن جي پنکڙين کي بند ڪريو ڇڏين ۽ گل ماندائي جي شڪل اختيار ڪندو آهن ۽ جڏهن گوڙا ٺهڻ شروع ٿيندا آهن ته انهن ۾ داخل ٿي ويندا آهن جنهنڪري گوڙي جي واڌ رڪجو وڃي ۽ چڻيو پون هي ڪينٽان ڪپهه جي بچ توڙي تند کي کائي ڪمزور ڪري ڇڏيندا آهن هن جيت جو حملو ميرپروخاص ۽ سانگهڙ ضلعي ۾ وڌيڪ ڏٺو ويو آهي ڇاڪاڻ ته هنن ضلعن ۾ وونڻن جي فصل کي سڄو سال بيهارڻ سان ان ۾ واڌ اچي ٿي. جيڪڏهن فصل کي وقت اندر ڪٽيو وڃي ته ان جي حملي ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي.

### آمريڪن ڪينٽون (American Bollworm)

هي ڪينٽون گهري سائي ۽ سرخي مائل رنگ جو هوندو آهي. هن جا پوپٽ زرد يا خاڪي رنگ جا ٿيندا آهن. ان جي ڀرن تي ڪاري يا گهري خاڪي رنگ جون لڪيرون هونديون آهن. سوپٽ وري زمين جي ڌرن ۾

ٺهندا آهن. سوپٽ جا پٽي سرا گول هوندا آهن، پر پڇ تي اپريل ڪندا هوندا آهن. مادي پوپٽ 200 کان 500 آنا لاهيندي آهي. تازه لٿل آنا هلڪي پيلي رنگ جا ٿيندا آهن. آنا 2 کان 8 ڏينهن ۾ ڦٽندا آهن 15 کان 20 ڏينهن



۾ سوپٽ ۽ 8-10 ڏينهن ۾ بالغ جيت پوپٽ مان نڪرندا آهن. سال ۾ اٽڪل 4 کان 6 نسل پورا ڪندا آهن نئون ڦٽل ڪينٽان ٻوٽي جي نازڪ حصن مان خوراڪ حاصل ڪندا آهن ۽ بعد ۾ گوڙي ۾ داخل ٿي ان کي نقصان پهچائن ٿا. هي ڪينٽون هڪ ئي وقت ڪيترن ئي گوڙن، گلن ۽ مڪڙين کي نقصان رسائي ٿو. هن ڪينٽين سبب 12 کان 17 سيڪڙو مڪڙيون، گل ۽ گوڙا تباه ٿي وڃن. جيئن ته هي ڪينٽون ڏيک ۾ ڪجهه وڏو ٿئي ٿو، ان ڪري حملي وقت بدن جو پويون حصو گوڙي ۾ سوراخ کان ٻاهر نظر ايندو آهي. کاڌل مڪڙيون ۽ گوڙا چڻيو پون. هن جيت کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ جڏهن فصل تي آنا موجود هجن يا انهن مان شروعات ۾ ڪينٽان ڦٽن ته زهريلي دوائن وسيلي ختم ڪرڻ جو بهترين ۽ موزون وقت هوندو آهي. هن جيت جا ڪافي ميزبان ٻوٽا جهڙوڪ مرچ، تماڪ، ۽ مڪئي وغيره ٿين ٿا هن کي وونڻن جي وچ ۾ نه پوکجي.



**سائي رنگ وارو پوپٽ**  
(Chrysoperla Camea)

هن جيت کي عام طور تي ساون پرن وارو پوپٽ سڏيو ويندو آهي. هي هاري دوست ڪينئون آهي. هن ۾ ميوڻي، پاپڻ ۽ فصلن جي نقصانڪار جيتن کي

کاڌڻ جي صلاحيت آهي. انهي جي ڪري هي ڪينئون دنيا ۾ مقبول آهي. ڪپه جي فصلن ۾ رس چوسيندڙ جيت جهڙوڪ ٿرڙو، اڇي مک، ساڻو مڱلو، سست مڱلو ۽ جونءَ کي ختم ڪرڻ کان علاوه گلابي ڪينئين، آمريڪي ۽ چٽڪري ڪينئين لاءِ به مفيد آهي. مادي پنهنجي حياتي ۾ 300 کان 350 بيضا ڏيندي آهي ۽ سائي رنگ جا سڀئي ڏانڊن جي هڪ سري تي هوندا آهن ۽ ڏانڊيءَ جو ٻيو حصو ٻوٽي جي پنن جي مٿين حصي مضبوطي سان جڙيل هوندو آهي. بيضن مان تقريبن 3 يا 4 ڏينهن بعد لاروا نڪرندا آهن. بيضن جي رنگت پهرين سائي ۽ ڪينئان نڪرڻ کان تقريبن 24 ڪلاڪ پهرين سرمائي رنگ جا ٿين ٿا ۽ لاروا نڪرڻ کان پوءِ بيضا اڇي رنگ جا ٿي ويندا آهن. ڪينئن جو رنگ شروع ۾ هلڪو ساڻو ۽ پوءِ بادامي مائل سرمئي رنگ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. هي ڪينئان جيڪي نقصانڪار ڪيڙن جي دشمن جو درجو رکندا آهن، پيدا ٿيڻ شرط پنهنجي شڪار کي تلاش ڪرڻ شروع ڪندا آهن ۽ دشمن ڪيئن خواهه اهي ڪهڙي به حالت ۾ هجن، يعني بيضا، ڪينئان، پيوپا، انهن کي کائي ختم ڪريو ڇڏين. ڪينئن جو عرصو 8 کان 9 ڏينهن تائين ٿيندو آهي ۽ ان کانپوءِ هي سفيد رنگ جي غلاف ۾ پيوپي جي حالت ۾ رهندو آهي. تقريبن 8 کان 9 ڏينهن بعد ان مان بالغ پوپٽ نڪرندا آهن. هي پوپٽ نڪرڻ کانپوءِ تقريبن 60 کان 80 ڏينهن تائين زندهه رهن ٿا. پوپٽ دشمن ڪيڙن جو شڪار نه ڪندا آهن، پر هي گلن ۽ گوگڙن جو رس چوسي پنهنجي زندگي گذارين ٿا. مادي ٻوٽن تي مختلف جڳهن تي 24 ڪلاڪ ۾ 20 کان 40 بيضا ڏيندي آهي، جن مان نڪرندڙ ڪينئان دشمن جيتن جو شڪار ڪندا آهن ۽ اهڙي طرح ائين انهن جو عمل جاري رهندو آهي. ڪرائسوپا کي مهلي کاڌ وارو جيت به چيو ويندو آهي هڪ اندازي مطابق هڪ ڪينئون 8 کان 9 ڏينهن ۾ 300

## فائديمند جيت

فصلن ۾ قدرتي طور ڪجهه فائديمند جيت موجود هوندا آهن، جيڪي نقصانڪار جيتن کي کائي ختم ڪرڻ ۾ مدد ڪندا آهن. ڪجهه ترقي يافته ملڪن جي تجربي گاهن ۾ انهن جيتن جي وڏي مقدار ۾ پرورش ڪري انهن کي وونڻن جي نقصانڪار جيتن کي ختم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. اسانجي ملڪ ۾ گذريل 10 سالن کان هن طريقي تي ڪم ٿي رهيو آهي. گهڻيون سهولتون ميسر نه هجڻ ڪري صرف ٿرائڪو گرامه تي ڪم ڪيو ويو آهي، جيڪو وونڻن ۽ ڪمند جي جيتن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، پر ان هوندي به خاطر خواهه نتيجا حاصل نه ٿي سگهيا آهن. ان جو مطلب اهو آهي ته اسان جا آبادگار انهن جيتن جي صحيح سڃاڻپ نٿا رکن ۽ هو انهن کي ڳوهاري وسيلي ختم ڪريو ڇڏين. هنن فائديمند جيتن جا ڪيترائي قسم فصلن ۾ موجود هوندا آهن، جهڙوڪ تنڊڻيون، ڪرائيسوپا، اوريس، وڏين اکين وارو منگهن، سونڊ وارو منگهن، ڪيمپيلوما، ماکوڙي، ڪوريٽڙا ۽ انهن کانسواءِ ڪيترائي طفيلي ڪيڙا جهڙوڪ اڇي مک ۽ گوگڙي واري ڪينئين سان گڏوگڏ ميلي بگ لاءِ ٿرائڪو گرامه بهترين تفصيلي جيت آهي. انهي کانسواءِ پيٿوجينس (Pathogens) وغيره پڻ ٿيندا آهن. مٿين فائديمند جيتن کي نقصانڪار جيتن ۾ شمار ڪرڻ کان پاسو ڪيو وڃي عام طور تي اهو ڏٺو ويو آهي ته فائديمند ۽ نقصانڪار جيتن جي صحيح سڃاڻپ نه هئڻ ڪري نقصانڪار جيتن سان گڏ فائديمند جيت به ختم ٿيو وڃن. قدرتي بچاءُ واري طريقي تحت فصلن ۾ فائديمند جيت ۽ طفيلي ڪيڙا جهڙوڪ ٿرائڪو گرامه جي منتقلي ڪرڻ گهرجي، ته جيئن قدرتي طور نقصانڪار جيتن تي ڪنٽرول ڪري سگهجي. انهيءَ کانسواءِ جنسي ڪشش وارا ڦندا يا (Sex Pheromones Trap) بجلي جي بلب وارا ڦندا (Light Trap) استعمال ڪرڻ گهرجن، ته جيئن نقصانڪار جيتن جي نسل ڪشي ڪري سگهجي ۽ جيترو به ٿي سگهي زهريلي دوائن کان پاسو ڪرڻ گهرجي انهن فائديمند جيتن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.



**پتي واري تنڊڻي**  
(Rove Beetle)

هي فائديمند جيت به وونشن سان گڏ ٻين فصلن تي به ڏٺو ويو آهي. هن جو جسم ڳاڙهي رنگ جو ۽ پيٽ جي وچين حصي تي نيري رنگ جو پٽو ٿيندو اٿس. هيءَ تنڊڻي مختلف قسمن جي جيتن جهڙوڪ ٿرڙو، مھلو ۽ ڳاڙهي جونءَ کي کائي ختم ڪري ڇڏي.

**پائريٽ اوريڊس منگھڻ پڇو**  
(Pirate Bug)

هن جيت جا ٻچا ڳاڙهي رنگ جا ۽ بالغ ھلڪي ناسي رنگ جا ٿين ٿا. سندن تعداد فصل جي وچين مرحلي ۾ ڪافي مقدار ۾ موجود هوندو آهي. ٿرڙي کي کائي ختم ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿو. انهيءَ ڪانسواءِ هيءَ جيت گوگڙي جي ڪيٽين جا آنا پڻ کائيندو آهي.

**سائي رنگ وارو منگھڻ**  
(Campylomma)

هيءَ جيت ھلڪي سائي رنگ جو ٿيندو آهي. شڪل ۾ مھلي کان ڪجھه وڏو نظر ايندو آهي. وونشن جي فصل تي هن جو ڪافي تعداد هوندو آهي. هن جيت جا ٻچا توڙي بالغ رس چوسيندڙ جيتن کي کائيندا آهن.




کان 400 سائو مھلو ۽ 250 کان وڌيڪ اڇي مک جا پيوپيا شڪار ڪندو آهي، بالغ پوپٽ ڪيٽيون پڻ موسمي حالات ۽ غير معمولي تبديلين مثلاً درجہ حرارت ۽ هوا ۾ گھڻي تناسب کي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. هن ڪيڙي کي ڪپھ کان پوءِ مختلف فصلن تي به استعمال ڪيو ويندو آهي.

### استعمال جو طريقو:

ليبارٽريءَ ۾ تيار ڪيل ڪارڊ جن ۾ 250 ڪرائسوپا هوندا آهن، وونشن ۾ في ايڪڙ 40 هزار کان 60 هزار تائين يا وري 160 کان 240 ڪارڊ في ايڪڙ جون کان سيپٽمبر تائين استعمال ڪجن. ڪرائسوپا ڪارڊن کي في ايڪڙ جي حساب سان صبح جو سوير فصل ۾ چٽني ڪنڊن ۽ وچ واري حصي ۾ برابر تقسيم ڪري لڳايا وڃن پٺن جي هيٺين حصي تي پٺن يا ڏاڳي سان ٻڌي ڇڏجي. خيال رهي ته سج جون شعاعون سڌيون اثر انداز نه ٿين. هي عمل هر 15 ڏينهن کان پوءِ عمل ۾ آندو وڃي، جيسيتائين نقصانڪار جيتن جو خاتمو ٿي وڃي.

**چٽڪري تنڊڻي**  
(Ladybird Beetle)



هن جو جسم ڳاڙهي رنگ جو، مٿان ڪارا ٽپڪا يا وري لڪيرون هونديون آهن. سندس پيٽ ڪاري يا وري پوري رنگ جو هوندو آهي. هن

تنڊڻيءَ جا آنا ننڍڙا بيدي جهڙا ڦڪي رنگ جا ٿيندا آهن. هيءَ تنڊڻي پنهنجي حياتيءَ ۾ 400 کان 600 آنا لاهيندي آهي. مھلي کي کائي ختم ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿي. تجربن مان معلوم ٿيو آهي ته هڪ ڏينهن ۾ 200 کان 400 تائين مھلي وارن جيتن کي کائي سگھن ٿا. ترقي يافتہ ملڪن ۾ هنن جيتن جي پرورش ڪري فصلن ۾ ڇڏيا ويندا آهن. هن جا بالغ ۽ ٻچا، نقصانڪار جيتن جا آنا، ڪيٽن، سست مھلو، جونءَ، اڇي مک، ميلي بگ ۽ ٻين جيتن کي کائيندا آهن.



**طفيلي ڪيڙا**  
(Parasitic wasp)

هن جيت جا بالغ اچي مک کان  
ٿورو جسمات ۾ ننڍا هوندا آهن.  
سندن رنگ پيلو يا وري ڪارو ٿيندو  
آهي هن جيت جي مادي اچي مک جي  
پڇي (Pupa) جي مٿان پنهنجا آنا

لاهندي آهي. انهن آئن مان ننڍڙي جسمات جا ڪي نشان ڏٺندا آهن، جيڪي  
اچي مک جي پڇن کي کائي ختم ڪن ٿا. هن جيت جي مادي سون جي تعداد  
۾ آنا لاهيندي آهي. ڪپهه جي تحقيقاتي اداري طرفان هن جا 6 قسم معلوم  
ڪيا ويا آهن، جن مان 2 قسمن جي سڃاڻپ ٿي سگهي آهي. تجربن مان  
معلوم ٿيو آهي ته اچي مک جي حملي دوران هن جيت جو 40 سيڪڙو  
معلوم ڪيو ويو آهي. ترقي يافتہ ملڪن ۾ هن جيت جي ليبارٽري ۾ پالنا  
ڪري 35 هزار جيت في ايڪڙ جي حساب سان فصل تي ڇڏيا وڃن ٿا، جيڪي  
اچي مک کي کائي ختم ڪن ٿا ۽ اتي ڦوهاري جي ضرورت نه پوندي آهي.



**ٽرائڪوگراما**  
(Trichogramma)

هي جيت ننڍڙي قسم جي ڏينپو  
وانگر ٿيندو آهي، جيڪو قدرتي طور  
تي فصلن، پاجين ۽ باغات ۾ ٿيندو  
آهي. هن جو ڪم دشمن ڪيڙن جي

بيضن کي ڳولي انهن کي ختم ڪرڻ هوندو آهي خاص طور تي وونشن ۾  
آمريڪي، گلابي ۽ چٽڪري ڪيڙن، ڪمند ۾ پاڙ، ٿڌ، گرداسپوري ڪيڙن،  
مڪئيءَ ۾ ٿڌ داسي ڪيڙين، باغات ۾ صوف، زيتون، آڙو، ميون جا ڪيڙن  
هن جي پسنديدہ غزه آهن. هن جي مادي دشمن ڪيڙن جي آئن کي ڳولي ان



**سرفڊ فلائ (Syrphid Fly):**

هن جيت جا بالغ جسمات ۾ مک کان وڏا  
ٿيندا آهن. سندن جسم گهري چمڪدار سائي  
رنگ کان ناسي رنگ تي مائل هوندو آهي. هن  
جيت جا ٻچا توڙي ڪيڙن، اچي مک، ميلي بگ  
۽ معلي کي کائڻ ٿا.



**ڏينپو**  
(Wasp)

هيءَ فائديمند جيت رنگ جو پيلو يا وري  
ڪارو ٿئي ٿو ۽ گوگڙي جي ڪيڙن کي کائي  
ختم ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿو.



**وڏين اڪين وارو منگهڻ**  
(Grocoris)

هن جيت جو جسم گهري ناسي رنگ جو  
ٿئي ٿو ۽ وڏيون اڪيون اٿس هي فائديمند جيت  
گوگڙي وارن ڪيڙن جا آنا کائيندو آهي.



**ڪوريٽرو (Spider):**

هن جا ڪافي قسم هوندا آهن هي به  
فائديمند جيتن ۾ شمار ٿين ٿا. هي مختلف  
قسمن جي جيتن کي پنهنجي چار ۾ ڦاسائي  
کائي ختم ڪريو ڇڏين ٿا ۽ هر وقت فصل ۾  
موجود هوندا آهن.

انهي لاء اهو تمام ضروري آهي ته انهن فائديمند جيتن جي صحيح سڃاڻپ ڪري ۽ انهن جي تعداد کي وڌائي اسان نه رڳو نقصانڪار جيتن کان ڇٽڪارو حاصل ڪري سگهون ٿا، پر انهيءَ گڏوگڏ زهريلي دوائن جي استعمال کي گهٽائي ناٿوبه بچائي سگهون ٿا.

حياتيائي طريقي سان بچاءُ جي لاءِ هيٺيون چند ڳالهون ضروري آهن.

1. وونڻن جي فصل ۾ نقصانڪار ۽ فائديمند جيتن جي سڃاڻپ ڪري سندن تعداد معلوم ڪرڻ.
2. ليبارٽري ۾ فائديمند جيتن جي پالنا ۽ سندن زندگي ۽ صلاحيت جي باري ۾ تجربو ڪيا وڃن.
3. فصلن ۾ لوهي جاري جا پنجره ٺاهي نقصانڪار ۽ فائديمند جيتن متعلق ۽ سندن صلاحيت بابت تجربو ڪرڻ.
4. وونڻن جي فصل ڀرسان لوسٽ پوکڻ گهرجي ته جيئن فائديمند جيت وونڻن جي جيتن کي کائي ختم ڪري سگهن.
5. ليبارٽري ۽ فيلڊ ذريعي دوائن جو فائديمند جيتن تي اثر بابت تجربو ڪيا وڃن ته جيئن فائديمند جيتن تي گهٽ اثر ڪندڙ دوائون ضرورت مطابق استعمال ڪري سگهجن.
6. ٿي سگهي ته ٻين فصلن مان فائديمند جيت گڏ ڪري وونڻن جي فصل ۾ ڇڏيا وڃن.

جي مٿين حصي ۾ ڏنگ هڻي سوراخ ڪندي آهي ۽ ان ۾ پوءِ پنهنجو نسل وڌائڻ لاءِ 2 کان 3 بيضا ڏيندي آهي. هڪ ڏينپو هڪ ڏينهن ۾ 1 کان 10 ۽ پنهنجي پوري زندگي ۾ تقريبن 190 دشمن ڪيڙن جي بيضن کي کائي ختم ڪندو آهي هن ڏينپو جا ٻچا ڏنگ هڻڻ کانپوءِ 24 ڪلاڪن ۾ بيضن مان نڪري ۽ اڳئين 10 ڪلاڪن ۾ دشمن جيتن جي بيضن جي زردِي کائي ڇڏيندا آهن. 3 کان 4 ڏينهن ۾ ٻچا جوان ٿين ٿا ۽ دشمن ڪيڙن جي آنن جي رنگت ڪاري ٿي ويندي آهي ۽ ان سان گڏوگڏ نئون ڏينپن جي نڪرڻ لاءِ سوراخ ڪري ڇڏيندا آهن. تقريبن 7 کان 9 ڏينهن اندر ڏينپو نما ٽرائڪوگراما ٻاهر نڪري ايندا آهن. اگر درج حرارت 32 سينٽي گريٽ رهندو ته انهن جي نڪرڻ ۾ 7 ڏينهن لڳندا آهن. ڏينپو ٻاهر نڪرڻ کانپوءِ ٻوٽن ۾ موجود ميون ۽ پنن جو رس چوسي پنهنجي نسل کي وڌائڻ لاءِ دشمن ڪيڙن جي بيضن کي ڳولي ڏنگ هڻي انهن کي ختم ڪريو ڇڏين.

### استعمال جو طريقو

ليبارٽري ۾ تيار ڪيل ڪارڊ تي تقريبن 500 کان 1000 ڏينپو هوندا آهن. وونڻن ۾ ٺي ايڪڙ 50 هزار کان 75 هزار يا 20 کان 25 ڪارڊ جولاءِ کان سيپٽمبر تائين استعمال ڪجن. ٽرائڪوگراما جي مقرر ڪيل تعداد فصل ۾ صبح جو سويل چئني ڪنڊن ۽ وچ ۾ برابر حصو ڪري لڳائڻ گهرجن. پنن جي هيٺين حصي تي پن يا ڏاڳي سان لڳائجي ته جيئن سج جون شعائون سڌيون ان تي نه پون. ڪارڊ لڳائڻ جو عمل هر 15 ڏينهن کان پوءِ ڪرڻ گهرجي.

### حياتيائي طريقي مان فائدا:

1. نقصانڪار جيتن جو قدرتي طرح توازن رکن ٿا.
2. ماحول ۽ انساني صحت تي اثر انداز ڪون ٿين.
3. هي بچاءُ جو طريقو ٻين بچاءُ جي طريقن کان سستو آهي.
4. نقصانڪار جيتن ۾ قوت مدافعت جو مسئلو پيدا نٿو ٿئي.

## حياتياتي ڪنٽرول جو طريقو (Biological Control):

- فصل ۾ جتي نقصانڪار جيت موجود آهن ته انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ قدرت فائديمند جيت به پيدا ڪيا آهن، جن کي اسان هاري دوست چئون ٿا.
- فائديمند جيتن جي صحيح سڃاڻپ ڪرڻ.
- فائديمند جيتن کي نقصانڪار جيتن ۾ شمار ڪرڻ کان پرهيز ڪرڻ.
- قدرتي بچاءُ جو طريقو فصل ۾ فائديمند (Predators) ۽ طفيلي (Parasites) ڪيڙا جهڙوڪ ڪرائسوپا ۽ ٽرائڪوگراما جي منتقلي ڪرڻ ته جيئن قدرتي طور نقصانڪار جيتن تي ڪنٽرول ڪري سگهجي.
- جنسي ڪشش (Sex pheromones) ۽ روشني جا ڦندا (Light Trap) وغيره ته جيئن انهن نقصانڪار جيتن جي نسل ڪشي ڪري سگهجي.
- دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ انهن فائديمند جيتن کي پالي انهن کي فصل ۾ ڇڏيو وڃي ٿو، ليڪن اسان وٽ سهولتون نه هئڻ سبب اسان انهن کي وڌائي ته نه سگهيا آهيون، بلڪه دوائن جو غلط ۽ بيجا استعمال ڪري انهن فائديمند جيتن کي گهٽائي رهيا آهيون.

## دوائن وسيلي ڪنٽرول ڪرڻ جو طريقو (Chemical Control):

زهريلي دوائن وسيلي جيتن کي ختم ڪرڻ آخري حربو آهي جڏهن ٻيا سڀ طريقا آزمائش کانپوءِ به جيت نقصان جي اقتصادي حد تائين پهچي وڃن ته پوءِ اهڙي طريقو جيتن کي ختم ڪرڻ جو اهم ذريعو آهي نقصانڪار جيتن جي صحيح سڃاڻپ ڪري ۽ صحيح دوائن جي استعمال سان انهن جيتن کي ڪنٽرول ڪري سگهجي.

## مختلف قسمن جي جيتن جي نقصان جي اقتصادي حد:

| رس چوسيندڙ جيت | گوگڙي وارا ڪيڻان                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٿرڙو           | مختلف مرحلن تي يعني: 15 جولاءِ کان 15 آگسٽ 15 سيڪڙو                                         |
| اڇي مک         | 16 آگسٽ کان 15 سيپٽمبر 10 سيڪڙو                                                             |
| سائو مھلو      | 15 سيپٽمبر کانپوءِ 5 سيڪڙو                                                                  |
| سست مھلو       | يا وري چٽڪري ڪيڻن جا 3 لاروا 25 ٻوٽن تي ريكارڊ ڪرڻ آمريڪن ڪيڻن جا 5 پورا آنا يا وري 3 ڪيڻان |
| جونءُ          | گلابي ڪيڻن جا 5 ڪيڻان 100 گوگڙن ۾ نظر اچڻ                                                   |

جيتن کي ڪنٽرول ڪرڻ جا مختلف طريقا  
هٿرادو طريقو (Control Cultural)

- زمين جي بهتر تياري. سفارش ڪيل جنس جي بچ جو استعمال.
- قوت مدافعت رکندڙ جنسن جي پوکي. ڇڏائي ڪرڻ. فصلن جي ڦيرڦار ڪرڻ.
- ترتيبوار پاڻي ۽ پاڻ جو استعمال، ٻي صورت ۾ ڪشش رکندڙ ٻوٽا جيتن کي پاڻ ڏانهن مائل ڪندا.
- ميزبان ٻوٽن جو خاتمون
- وونڻن انيون سڪل گوگڙا ساڙي ڇڏجن ۽ اونهه هر هلائي زمين ۾ رهيل ڪيڙن کي اُس جي تپش رستي ناس ڪجي.